

CATALOGUE DES SCOLOPENDRIDES

DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

(COLLECTION DU MUSÉUM DÉTERMINÉE PAR

M. LE PROFESSEUR KARL KRAEPELIN, ET COLLECTION H. W. BRÖLEMANN).

PREMIÈRE PARTIE. — **Scolopendrides** en dehors du genre **Scolopendra**.

Cryptops.

- CRYPTOPS? BOTTEGH Silvestri. — Erythrée : Dintorni di Adi-Ugri et Adi Caié [Andreini leg. 16-30 juin 1901 et 12 juillet 1902] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- NUMIDICUS Lucas. — Algérie (H. Lucas, 1849. Type!); Maroc : cap Spartel, 14 janvier, et Boubana, 3 mars (G. Buchet, 1901); République Argentine : Tandil (Forgues, 1884).
- TRISULCATUS Bröleman = *C. biscarensis trisulcatus* Brölemann. — Pyrénées-Orientales : Port-Vendres [don de V. Mayet]. Type! Canaries : île Fuerteventura [Ch. Alluaud] et île Canarie [Ch. Alluaud, st. n° 26, 2 janvier 1890] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Canaries : Barancos de los Nieves, 5 février 1897 (G. Buchet, 1897).
- ANOMALANS Newport. — France : Paris; serres du Jardin des Plantes, 11 décembre 1895, allées du Jardin des Plantes, 27 mai 1887; Eure : Lyons-la-Forêt, Mortemer, Asnières-sur-Oise, Italie, Lombardie, Milano, Turkestan et gouvernement de Takou : Lenkoran [1892] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Algérie (H. Lucas, 1896).
- HYALINUS Say. — Louisiane [Eug. Simon] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- SPINIPES Pocock. — Australie : Victoria [coll. François] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- BIVITTATUS Pocock. — Colombie : Sierra de Santa-Marta [Chazalic-Dalmas, mars 1896] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- MEGALOPORA Haase. — Haut-Carsevenne (F. Geay, 1897).
- CANARIENSIS Latzel. — Canaries : île Tenerife et île Canaria, st. n° 57 [Ch. Alluaud] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

CRYPTOS HORTENSIS Leach. — France : Toutteville; Allier : Le Vernet, Vichy; Malavaux et Bois de Randan; Trou des Godes (près d'Hyères); Basses-Alpes : lac d'Allos, 2,000 mètres d'altitude, Carnelle, Chaumont-en-Vexin, Châteauroux; Basses-Pyrénées : Ahusquy, bois d'Ithé [Naboleguy]; environs de Lyon : Decines, Barbezieux, Eure et Seine-Inférieure [Gad. de Kerv.]; Rouen : Forêt-Verte; Lyons-la-Forêt : canton du Gouffre, Sospel [Sainte-Claire-Deville] et Menton, la Ferté-Milon; Aude : Belcaire, 1,200 mètres d'altitude [V. Mayet], Fontaine-de-Vaucluse; Paris : serres du Jardin des Plantes; Gard : Lirac, Pont-du-Gard et Bellevue (près Avignon), Italie; Lombardie : Milano, Collio, Valtrompie, Malnate, Alzate, Emilie : Borgotaro, Dalmatie : Castelnuovo, Roche di Cattaro; Herzégovine : Iablanica; île Canaria, st. n° 57 et île Tenerife [Ch. Alluand]; Açores : Caldeira de Corvo [prince de Monaco] et Madère [coll. Alluand] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); France : Cormeilles (H. Lucas, 1891); Madère (Fauvel, 1897).

— *DORLE* Pocock. — Australie : Victoria [coll. François] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— sp. — Nilguries : Coonoor, 14-31 juillet 1901, 2,000 mètres d'altitude (Maurice Maindron, 1902); Pérou : Paita (Eydux, 1838).

Theatops Newport.

TREATOPS SPINICAUDUS Wood. — Nouvelle-Caroline [E. Simon] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— *POSTICUS* Say. — Nouvelle-Caroline et Louisiane [E. Simon] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

Otocryptops Haase.

OTOCRYPTOS GRACILIS Wood. — Californie (Lorquin, 1853).

— *RUBIGINOSUS* L. Koch. — Japon (Boucard, 1900); Japon (1869).

— *SEXSPINOSUS* Say. — Japon : Yokohama [E. Simon]; États-Unis d'Amérique : Washington, Ter. I., Nouvelle-Caroline et Louisiane [E. Simon]; Indiana : Bloomington [1885] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— *FERRUGINEUS* Linné. — Haut et Bas-Carsevenne (F. Geay, 1897 et 1898); Vénézuéla : colonie Tovar [E. Simon, février 1888]; Guatémala [J.-J. Rodriguez, leg. 1892 et 1903] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

OTOCRYPTOPS MELANOSTOMUS Newport. — Java : *Sockaboemi* [coll. Prillwitz, 1895]; Vénézuéla : San Esteban, mars 1888, et Corozal, février 1888 [E. Simon]; Costa Rica : Isla del Coco [P. Biolley, 11-18 janvier 1902] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Haut et Bas-Carsevenne (F. Geay, 1897 et 1898); Saint-Domingue (Sallé, 1861).

Scolopocryptops Newport.

SCOLOPOCRYPTOPS MIERSII Newport. — Brésil : Para, 10 févr. 1900 [Goeldi] et Vénézuéla : San Esteban [E. Simon, mars 1888] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Guyane : Contesté franco-brésilien, Bas-Carsevenne et Oyapock : Camopi (F. Geay, 1899 et 1900); Cayenne [coll. Lacordaire] (H. Lucas, 1877); Sainte-Lucie (A. Fleury, 1897).

Newportia Gervais.

NEWPORTIA ERNSTI Pocock. — Vénézuéla : Caracas [E. Simon] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Haut-Carsevenne (F. Geay, 1897).

— **AMAZONICA** Brölemann. — Brésil : Manaos [Bicego leg. (v. Ihering), Co-types] et? Sertão de Pernambuco [Gounelle, 1889]? (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— **LONGITARSIS** Newport. — Brésil : Manaos [Bicego leg. (v. Ihering)]; Vénézuéla : colonie Tovar, Corozal, Caracas et La Cumbre [E. Simon, 1888] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Caracas (Chaper, 1885); Haut et Bas-Carsevenne (F. Geay, 1897 et 1898).

— **VAR. SARARENSIS** Brölemann. — Bas-Sarare (F. Geay, 1896. Types et type anormal! *Ann. Soc. ent. p. 319, 1898, fig. 1-2*).

— **SIMONI** Brölemann. — Vénézuéla : La Gayra et Corozal [E. Simon, janv. et févr. 1888] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— **COLLARIS** Kraepelin. — Bas-Carsevenne (F. Geay, 1898. Types!); Guyane : Territ. contesté (F. Geay, 1899).

— **ROGERSI** Pocock. — Costa-Rica : Isla del Coco [P. Biolley, 11-18 janv. 1902] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— **MONTICOLA** Pocock. — Équateur : Troya (D^r Rivet, 1901).

— **BICEGOI** Brölemann. — Brésil : Manaos [Bicego leg. (v. Ihering)] (coll. H.-W. Brölemann, 1902. Co-types!).

Otostigmus Porat.

OTOSTIGMUS SPINICAUDUS Newport. — Maroc : oued Melha, oued Sidi, Mont-Bark, 4 juill. 1897; oued Sidi Hamadsech, 5 juill. 1897; de Zawit-

moulaihanam à Tacondud, 15 juill. 1897; Heheri, 12 juin 1897 (G. Buchet, 1897); Ténérife (1878); Algérie : Oued-Rir [Künckel d'Herculeis]; Canaries : île Lanzarote, station n° 51 [Ch. Alluaud, 3 févr. 1890], île Fuerteventura [Ch. Alluaud] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Algérie : Touggourt et Tunisie : Gabès (coll. Noualhier, 1898); Chott [1874-1875] (Duveyrier, 1897).

OTOSTIGMUS ACULEATUS Haase. — Tonkin : frontière du Kouang-Si (A. Weiss, 1901).

— *POLITUS* Karsch. — Chine : Pékin (montagne) et environs de Pékin, Shensi mérid. : Inkiaphou et Hang-tchong-fou [1873] (A. David, 1872 et 1873); Australie : North Queensland : Cooktown [E. Simon] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— *GEOPHILINUS* Haase. — Soambawa [von Grelatt, 1895] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— *CEYLONICUS* Haase. — Birmanie : Palon [voyage de L. Fea, 1885-1889] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— *SCABER* Porat. — Birmanie : Malewoon [voy. de L. Fea, 1885-1889]; Chine : île de Tchou-San [coll. R.-P. Barberet, 1/2 Nadar, 1894] et ouest de Chang-Haï [coll. abbé de Joannis] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Cochinchine : montagne de Chaudoc [janv. 1877] (Harmand, 1877); Siam : Lakhone (Dugast, 1891).

— *INSULARIS* Haase. — Bhoutan anglais (R. Oberthür, 1899); Philippines : pén. des Camarines, Vulcan de Mayon, Tabaco d'Albay [E. Simon] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— *ASPER* Haase. — Mariannes (Marche, 1888).

— *PUNCTIVENTER* Tömösvary. — Côte or. de Sumatra : Palembang, forêt du Nirou (Bouchard, 1902); Philippines : pén. des Camarines, Vulcan de Mayon, Tabaco d'Albay [E. Simon] et île Vanikoro [Ph. François, nov. 1893] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— *ASTENUS* Kohlrausch. — Matupi (Mus. de Hambourg, 1903); Philippines : Luçon, 1875 (Laglaize, 1875); Mariannes (Marche, 1889); Nouvelle-Calédonie : Vallicoro, 1893 (François, 1894).

— *RUGULOSUS* Porat. — Seychelles : île la Digue et Mahé [coll. Ch. Alluaud]; Birmanie : Palon [voy. de L. Fea, 1885-1889] et île Maurice (coll. H.-W. Brölemann, 1902); île Maurice : Curepipe (Ch. Alluaud, 1900); Siam (P. Larnaudie, 1864); envir. de Bangkok (Harmand, 1882).

- OTOSTIGMUS SPINOSUS* Porat. — Algérie : Biskra (coll. Noualhier, 1898); Java : Buitenzorg (D^r Spire, 1901); Java : Sockaboemi [coll. Prillwitz, 1895]. (Coll. H.-W. Brölemann, 1902.)
- *ORIENTALIS* Porat. — Nilgiris : Coonoor, 14-31 juill. 1901, 2,000 mètres d'altit. (Maurice Maindron, 1902); Cochinchine : Saïgon [Holbé, 1885-1886], Seychelles : île Marianne [coll. Ch. Alluaud]; Samoa : île d'Ououlou [D^r Philippe, 1888]; Nouvelles-Hébrides et Vaté [coll. Ph. François] et Fidji [coll. D^r Philippe, 1888] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *METALLICUS* Haase. — Sumatra : Palembang, forêt du Nirou (Bouchard, 1902).
- *MULTIDENS* Haase. — S. O. de Bornéo : Bendjermasin (Mus. de Hambourg, 1903); Java : Sockaboemi [coll. Prillwitz, 1895] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *PRODUCTUS* Karsch. — San Thomé (Musée de Hambourg, 1903).
- *SCABRICAUDUS* Humbert et Saussure. — Brésil (Glaziou, 1888); Brésil : Sao Paulo, Piquette et Alto da Serra [Ihering]; Costa-Rica : Isla del Coco [P. Biolley, 11-18 janv. 1902] et Guatémala [J.-J. Rodriguez, 1891] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Cayenne (Mélinon, 1876).
- *DENTICULATUS* Pocock. — Guatémala [J.-J. Rodriguez, 1891 et 1903] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *POCOCKI* Kraepelin. — Haut-Carsevenne (F. Geay, 1897. Type!).
- *SILVESTRII* Kraepelin. — Équateur : Riobamba, San Gabriel et envir. de Tulcan (D^r Rivet, 1901 et 1902).
- *GYMNOPUS* Silvestri. — Gabon (Thollon, 1883); Congo (de Brazza, 1886).
- *GOELDII* Brölemann. — Vénézuéla : San Esteban [E. Simon, mars 1888] et Brésil : Para [Goeldi] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *INERMIS* Porat. — Vénézuéla : Colonie Tovar [E. Simon, févr. 1888] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Cayenne [coll. Lacordaire] (H. Lucas, 1877); Nouvelle-Grenade : Popayan (A. David, 1876).
- *FÜLLEBORNI* Kraepelin. — Congo franç. : Bas-Ogôoué, entre Lambaréné et la mer (E. Haug, 1901).
- *LIMBATUS* Meinert. — Bolivie [Gorlepp] et Brésil : São Paulo, Faren da Nova Niagara [E. Gounelle, janv. 1899] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

- OTOSTIGMUS MUTICUS* Karsch. — Lima et Cerros de Amancaes al N. de Lima [août, sept. et oct.] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Haut-Carsevenne et Guyane franç. : Camopi (F. Geay, 1897 et 1900).
- *INERMIPES* Pocock. — Congo franç. : N'Kogo (H. Bonnet, 1903).
- *CAUDATUS* Brölemann. — Brésil : Sao Paulo, Itapetininga [Ihering, janv. 1897] (coll. H.-W. Brölemann, 1902. Co-type!); Guyane franç. (F. Geay, 1900).
- *TIBIALIS* Brölemann. — Brésil [v. Ihering] (coll. H.-W. Brölemann, 1902. Co-types!); prov. de Rio Janeiro : Montagne des Orgues (E.-R. Wagner, 1902).
- Sp. — Cochinchine : Saïgon (Harmand, 1875); Java (Oberthür, 1899); Bornéo (Chaper, 1891); Abyssinie : Pays Gouragui [L. Didier leg., mars 1902] (mission du Bourg de Bozas, 1902), Isthme de Panama : Bas-Obispo (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

Alipes Imhoff.

- ALIPES MULTICOSTIS* Imhoff. — Assinie (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *GRANDIDIERI* Lucas. — Afrique or. : Tanga (Gierra, 1895); Kondoa (Bloyet, 1886).

Rhysida Wood.

- RHYSIDA IMMARGINATA* Porat. — Birmanie : Rangoon (Mus. de Hambourg, 1903); Nilgries : Coonoor, 14-31 juillet 1901, 2,000 mètres d'altit. (Maurice Maindron, 1902); Bachien (près Saïgon), mai 1885 (Pavie, 1886); Birmanie : Palon [voy. de L. Fea, 1885-1889]; Java : Sockaboemi [Prillwitz, 1894], Java [Gad. de Kerville, dedit], Vénézuéla : Caracas [E. Simon, 1888] et Guatémala [J.-J. Rodriguez, leg. 1891 et 1903] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *NUDA* Newport. — Ceylan, 1883 (Chaper, 1883); Siam : Bangtaphan (J.-M. Bel, 1893); Paraguay (Cochelet, 1868); Colon (Tombe, 1883).
- *TOGOËNSIS* Kraepelin. — Gambie [Gad. de Kerville] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *CALCARATA* Pocock. — Siam (Guyon, 1897); Bachien (près Saïgon), mai 1885 (Pavie, 1886).
- *LONGIPES* Newport. — Indes angl. : Bombay [E. Roman, 1892]; Brésil : Bahia [Ihering, 8 août 1896]; Sénégal : Sorres [Lataste, leg. Proust] et Patria ignota [Gad. de Kerville] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Pondichéry, Bengkalis, Kurrachee, août 1896; Pondichéry,

- août 1901; Malabar : Mahé, 1^{er} au 13 juillet 1901; Coromandel : Genji, sept. 1901; Ceylan : Kandy, mai 1901, et Nilgîries : Coonoor, 14-31 juillet 1901, 2,000 mètres d'altit. (Maurice Maindron, 1881, 1885, 1896, 1901 et 1902); Pondichéry (Reynaud, 1896; Dussumier, 1896); Ceylan, 1883 (Chaper, 1883); Cochinchine (Beauvais, 1884; [mars 1885] Girard, 1885); Philippines : Luçon (Porte, 1861); Madagascar : Majunga, mai 1896 (Bastard, 1896); Amérique (1899); Brésil, juin (Lucas, 1887).
- RHYSIDA CELERIS* Humbert et Saussure. — Pérou : départ. de Cuno, prov. de Sandia et Brésil Manaos [Bicego leg. (v. Ihering)] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Amazone (d'Anthonay, 1892); Vénézuéla (Chaper, 1885); Bas Sarare (F. Geay, 1896).
- *PAUCIDENS* Pocock. — Erythrée : Dintorni di Adi Caié : Sottii Sasei [Andreini coll., 12 juill. 1902] et Keren [Giauf. Turati, 1900] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Pondichéry, Velantanguel et Genji (Maurice Maindron, 1881).
- *LITHOBIODES* Newport. — Coromandel : Genji, sept. 1901 (Maurice Maindron, 1901).
- *CRASSISPINA* Kraepelin. — Coromandel : Genji (Maurice Maindron, 1881).
- *STUHLMANNI* Kraepelin. — Zambèze (Durand, 1882).
- *PETERSI* Porat. — Bhoutan anglais (R. Oberthür, 1899); Port-Élisabeth (Mus. de Hambourg, 1903).
- *CUPREA* Kraepelin. — Bhoutan : Maria Basti (R. Oberthür, 1900. Types!).
- *N. sp.?* — Pondichéry, août 1901 (Maurice Maindron, 1902).
- *Sp.* — Manille [Baer-Léveillé] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

Ethmostigmus Pocock.

- ETHMOSTIGMUS TRIGONOPODUS* Leach. — Province d'Angola : Huilla et côte occid. d'Afrique (P. Campana, 1886 et 1887); Congo (Dybowski, 1892 et 1894 [avec sa mue]; de Brazza, 1886); Thollon, 1892 et 1897; Guest, 1892; H. Pobéguin, 1892 [1880], Rigod 1903); Congo [Abeille de Perrin, 1/2 Gazagnaire], côte occid. d'Afrique : Loango [Petit aîné], Assinie et côte or. d'Afrique [coll. Nadar] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Congo franç. : Brazzaville (P. Bourdarie, 1900); Bas-Ogôoué, entre Lambaréné et la mer (E. Haug, 1901); Libreville (Pierre, 1889); Bassin de la

Sangha (E. Régnier, 1899); Ogooné : Franceville (Guiral, 1883; [oct. 1886]; Thollon, 1886); Alima Leketi (de Brazza, 1886); Mayombé : vallée du Kouilou (A. Vergnes, 1898 et 1899); Samkila (Marche, 1877); Rivière San Benito ou Eyo, mai (Guiral, 1885); Gabon (Aubry-Lecomte, 1854); Loango (Bonnel de Mézières, 1898; H. Pobéguin, 1900); Haut-Oubanghi (Viancin, 1895); Rives du Niger (Lanchier, 1883); Dahomey (Revol, 1897); Côte d'Ivoire (de Bovée, 1902); Assinie (Chaper, 1883); Cap Lopez, 1885 (Bois-Guillaume, 1903); Sierra Leone (Seignac-Lesseps, 1861); Guinée franç. : région de Kouroussa (H. Pobéguin, 1901); Tourane (Eydox, 1862); Île de Konakry (D^r Maclaud, 1897); Konakry [« Plantation Kakimbo »] (L. Adam, 1898); Haut-Cavally (Ch. van Cassel, 1899); Sénégal : Sirigui, Kali-méné (D^r Laffont, 1888); Soudan (Penty, 1863); Archip. du Cap-Vert (A. Bouvier, 1875); Bagamoyo : Kondoa (Bloyet, 1884); Tanga (Gierra, 1895); Chiré (E. Foa, 1895); Zanguebar : Mrogoro (Leroy, 1889); Haut-Zambèze (E. Foa, 1894); Abyssinie : Moulou [de Zeltner, leg. juin 1902] (mission du Bourg de Bozas, 1902); Algérie? (ménagerie des Reptiles du Mus. de Paris).

ETHMOSTIGMUS PYGOMEGAS Kohlrausch. — Bhoutan anglais : Maria Basti (R. Oberthür, 1899, 1900 et 1901).

— **CRIBRIFER** Gervais. — Île Bourou (Quoy et Gaimard, 1829. Type!)

— **BISULCATUS** Tömösvary. — Nord de Bornéo : Sandakan (Montano et Rey, 1880).

— **RUBRIPES** Brandt. — Java : Sockaboemi [coll. Prillwitz, 1895]; Australie : North Queensland, Cooktown [E. Simon, dedit] et Vanikoro [François, nov. 1893] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Chine (1903); Australie (Verreaux, 1847; de Mniszech, 1897); Queensland : Rockhampton (Thozet, 1870); Melbourne, baron von Mueller (1895); Brisbane (1867); Sydney (de Castelnau, 1879); Détroit de Torres : Thursday et Nouvelle-Guinée (Lix, 1890 et 1891); Îles Salomon (Jouffroy d'Albans, 1888); Tasmanie (Verreaux, 1847).

— **PLATYCEPHALUS** Newport. — Nilgiriés : Coonoor, 14-31 juillet 1901, 2,000 m. alt., Pondichéry et Malabar : Mahé (Maurice Maindron, 1901, 1902 et 1903); Java (Raffray, 1878); Dorey (Raffray et Maindron, 1878); Nouvelle-Bretagne (Lix, 1890).

— **SPINOSUS** Newport. — Ceylan (Deschamps, 1889); Colombo (Errington de la Croix, 1900).

Pithopus Pocock.

PITHOPUS CALCARATUS Pocock. — Brésil : Sertaô de Pernambuco [Gounelle] et Sancto-Antonio de Barra : Sertaô de Bahia [Gounelle, désert, 1889] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

Scolopendropsis Brandt.

SCOLOPENDROPSIS BAHIENSIS Brandt. — Sancto-Antonio de Barra : Sertaô de Bahia [Gounelle dedit, désert, 1889] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

Asanada Meinert.

ASANADA BREVICORNIS Meinert. — Obok, mars 1893, Mascate, nov. 1896 et Pondichéry, juin 1901 (Maurice Maindron, 1893, 1896 et 1902).

Pseudocryptops Pocock.

PSEUDOCRYPTOPS WALKERI Pocock. — Érythrée : Dintorni di Adi-Ugri [Andreini coll. juin et juill. 1901] et île Périm [D^r Jousseume, leg. 1^{er} févr. 1891] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

Cupipes Kohlrausch.

CUPIPES UNGULATUS Meinert. — Guyane franç. : Camopi et Oyapock : Ouanary (F. Geay, 1900).

— **GERVAISIANUS** C. L. Koch. — Algérie : [D^r R. Blanchard], Bône [Chevreux, juin 1896] et Alger : Saint-Eugène Observatoire, 25 mars 1888 (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Philippeville (H. Lucas, 1849); envir. d'Alger (Marès, 1896).

— **NEOGALEDONICUS** Kraepelin. — Nouvelle-Calédonie : Canala (Bougier, 1881. Types!).

— **IMPRESSUS** Pofat. — Paraguay (Cochelet, 1868); Cuba [Lefèvre, mars 1889] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— **ANDINUS** Kraepelin. — Pérou : Sandia et Bolivie [Gorlepp] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— Sp. — Bas-Sarare [Exemplaire jeune décrit et figuré par H.-W. Brölemann in *Ann. Soc. Ent.* 1898, p. 318, fig. 3.] (F. Geay, 1896).

Cormocephalus Newport.

CORMOCEPHALUS PUSTULATUS Kraepelin. — Nouvelle-Calédonie (Marie, 1897; Banaré, 1867. Type!).

- CORMOCEPHALUS PYGMAEUS* Pocock. — Coromandel : Genji, Mathéran (près de Bombay), nov. 1896; Pondichéry, août 1901, et Nilgîries : Coonoor, 14-31 juill. 1901 (Maurice Maindron, 1881, 1896 et 1902).
- *BUTNERI* Kraepelin. — Afr. or. allem. : Mombasa, juill. (D^r Fernique, 1900).
- *AURANTIPES* Newport. — Australie (Famerach, 1858); Victoria [coll. François] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Victoria intérieur : rivière Murray (de Castelnau, 1875); près de Port-Philipp, 19 juin 1895 (baron von Mueller, 1895); Melbourne (1897); Australie : Swan-River, 1844 (Verreaux, 1897).
- *VAR. MARGINATUS* Porat. — Australie : Swan-River, 1844 (Verreaux, 1847).
- *RUBRICEPS* Newport. — Nouvelle-Calédonie : Nouméa [D^r François] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Australie : Swan River, 1844 (Verreaux, 1897); Melbourne (baron von Mueller, 1895).
- *BREVISPINATUS* L. Koch. — Australie (Mus. de Hambourg, 1903).
- *WESTWOODI* Newport. — Tasmanie, sous les écorces d'*Eucalyptus*, déc. 1843, et Australie (Verreaux, 1844 et 1847); King George's (de Castelnau, 1877).
- *HUTTONI* Pocock. — Nouvelle-Zélande (Petit, 1852).
- *DISPAR* Porat. — Madagascar : Morondava, Ankotokotsy, 2 mai 1898 (G. Grandidier, 1899); Tananarive (Catat, 1890); Fort-Dauphin, 1^{er} déc., et Andrahomana (Ch. Alluaud, 1901); Majunga, 1892 (1903); Diego-Suarez : Montagne d'Ambre [coll. Ch. Alluaud] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Antsirana [plateau] (capitaine Ardouin, 1897); Nossi-Bé : Hellville, mai (D^r Joly, 1900); Nossi-Bé (Mus. de Hambourg, 1903); Détroit de Cook (H. Filhol, 1876).
- *VAR. SARASINORUM* Haase. — Ceylan : Nuwara Eliya [E. Simon, 1892] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *SETIGER* Pocock. — Victoria [François] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).
- *ELEGANS*, *VAR. GRACILIPLEURUS* Kraepelin. — Madagascar : col de Sakavalana (Ch. Alluaud, 1901).
- *NITIDUS* Porat. — Port-Élisabeth (Claine, 1896); Madagascar : Andrahomana [M. de P., 1901] et Fort-Dauphin : Manantantely (Ch. Alluaud, 1901).

CORMOCEPHALUS Var. WILLSI Pocock. — Madagascar (Catat, 1890); col de Sakavalana (Ch. Alluaud, 1901); Victoria (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— Sp. — Afr. austr. : pays des Basoutos, Cafreterie (Christol, 1889 et 1896); Cap de Bonne-Espérance (Chaper, 1897); Madagascar : Makaraingo (D^r Escoffre, 1898); Fort-Dauphin : la Vinangbe, 15 mai 1900 (D^r Decorse, 1900); Fort-Dauphin, 1^{er} déc. (Ch. Alluaud, 1901); Archip. des Loyalty, nov. 1886 (Caillot, 1886).

Hemiscolopendra Kraepelin.

HEMISCOLOPENDRA CHILENSIS Gervais. — Chili (Pissis, 1840 == *Scolopendra pallida* Gervais. Type!); Chili [Simon-Lataste?]; Chili : Cordillera de Chillan, déc. 1892 [Germain Lataste] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— LAEVIGATA Porat. — Républ. Argent. : Tandil (Forgues, 1884); Buenos-Ayres (Duhamel, 1864; Rafinesque, 1897); Nouvelle-Grenade : Popayan (A. David, 1876); Cayenne [coll. Lacordaire] (H. Lucas, 1877).

— MICHAELSENI Attems. — Patagonie : du Cuy au Rio Teca, oct.-nov. (H. de la Vaulx, 1898); Chili (Pissis, 1840); Cerros de Valparaiso, sept. 1894 [Carlos Porter-Lataste] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Coquimbo (Gaudichaud, 1832 et 1896); Santiago, 1838 (Gay, 1843).

— PLATEI Attems. — Chili : Cerros de Valparaiso, sept. 1894 [Carlos Porter-Lataste] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

— PUNCTIVENTRIS Newport. — Louisiane [E. Simon] (coll. H.-W. Brölemann, 1902).

Trachycormocephalus Kraepelin.

TRACHYCORMOCEPHALUS MIRABILIS Porat. — Érythrée : Sabarguma [coll. P. Magretti, 14 mars 1900] et Obok [Leveillé coll.] (coll. H.-W. Brölemann, 1902); Turquie d'Asie : Mossoul, févr. 1880 (de Saulcy, 1880); Mascate, oct. et nov. 1896, et Kurrachee, août 1896 (Maurice Maindron, 1896); Obok ([mars] Lartigue, 1886; [mars] 1893; Maurice Maindron, 1893; D^r Devaux, 1892; D^r Jousseau, 1895 et 1897); Périm (D^r Jousseau, 1903).

Arthrorhabdus Pocock.

ARTHRORHABDUS FORMOSUS Pocock. — Port-Élisabeth (Mus. de Hambourg, 1903); Cap de Bonne-Espérance (J. Verreaux, 1867; Chaper, 1897).
